

**Informativa per il paziente che è stato sottoposto a TC o RM
con somministrazione di Mezzo di Contrasto**

Udine, / /

In data odierna Lei è stato/a sottoposto/a a:

- TC con Mezzo di Contrasto**
- RM con Mezzo di Contrasto**

Etichetta del paziente

che ha richiesto l'impiego del seguente Mezzo di Contrasto:

- Iomeprolo [Iomeron 400], quantità ml
- Ioexolo [Omnipaque 350], quantità ml
- Acido Gadoterico [Claricyclic], quantità ml
- Gadobenato Dimeglumina [Multihance], quantità ml
- Gadoteridolo [Prohance], quantità ml

Il mezzo di contrasto che Le è stato iniettato endovena può in rari casi provocare effetti indesiderati, da lievi a importanti. In genere questi effetti si manifestano subito dopo la somministrazione del Mezzo di Contrasto stesso; in rari casi invece, questi effetti si possono manifestare anche dopo diverse ore dall'esame.

Nel caso Lei accusasse disturbi quali dolore o allargamento dell'ematoma nella sede dell'iniezione, prurito generalizzato, comparsa di gonfiore o bolle cutanee, difficoltà respiratorie, difficoltà ad urinare, è pregato/a di rivolgersi al proprio medico curante o alla sede di Pronto Soccorso più vicina al suo domicilio presentando questa certificazione.

Reazione avverse durante o entro 30 minuti dall'esecuzione dell'esame: Sì No

Ulteriori farmaci somministrati durante o dopo l'indagine:

- Idrocortisone succinato sodico [Flebocortid], quantità ml
- [principio attivo, nome commerciale, quantità]
- [principio attivo, nome commerciale, quantità]

Note:

Il Medico Radiologo